

Wanneer indicatie voor uitvoering spirometrie en gebruik medicatie?

	Astma	COPD	Aanvraag ZD/H+P
Diagnostische fase (inclusief reversibiliteit)	Ja	Ja	60 minuten
ASTMA			
Monitoring 6-12 weken met gestandaardiseerde bronchusverwijding	- Bij onvoldoende astmacontrole-> discrepantie tussen klachten en spirometrie of - Bij twijfel diagnose - Bij twijfel over (wijze van) gebruik van eigen medicatie		60 minuten
Onderstaande indicatie	Onder continuering eigen medicatie, tenzij bovengenoemde indicatie voor luchtwegverwijding		60 minuten
Rokers	Jaarlijks		30 minuten
Stap 3 medicatie	Jaarlijks		30 minuten
Na een longaanval	Jaar na een longaanval		30 minuten
Stap 1 medicatie	De eerste drie jaar jaarlijks		30 minuten
Stap 2 medicatie	De eerste drie jaar jaarlijks		30 minuten
COPD			
Lichte ziektelast Bij niet- of ex-rokers geen standaard		Alleen op indicatie bij: - Discrepantie tussen klachten en spirometrie uitslagen - Twijfel over de eerder gestelde diagnose - Gerede twijfel over gebruik van de eigen luchtwegmedicatie	60 minuten
Lichte ziektelast en roken		1 X per 3 jaar	30 minuten
Verhoogde ziektelast Ex- rokers		1 X per 3 jaar	30 minuten
Verhoogde ziektelast en roken		Jaarlijks	30 minuten

Geef bij een verwijzing voor de afname van een spirometrie **ALTIJD** aan de patiënt instructie mee over het gebruik van de eigen medicatie voorafgaand aan het onderzoek.

Wanneer indicatie voor uitvoering spirometrie en gebruik medicatie?

	Astma	COPD
Afspraken over het medicatiegebruik voor de afname spirometrie		
Diagnostische spirometrie	- Voor de test 8 uur geen kortwerkende - Voor de test 24 uur geen langwerkende luchtwegverwijders gebruiken	- Voor de test 8 uur geen kortwerkende luchtwegverwijders - Voor de test 12-48 uur geen langwerkende luchtwegverwijders
Bij herdiagnostiek	- Staak ICS ten minste 6 weken voor spirometrie - als ICS staken klachten geeft dan wel spirometrie op korte termijn <2-3dg	- Voor de test 8 uur geen kortwerkende luchtwegverwijders - Voor de test 12-48 uur geen langwerkende luchtwegverwijders
Controle	Altijd onder eigen medicatie, dus gewoon gebruiken	Altijd onder eigen medicatie, dus gewoon gebruiken

Geef bij een verwijzing voor de afname van een spirometrie **ALTIJD** aan de patiënt instructie mee over het gebruik van de eigen medicatie voorafgaand aan het onderzoek.